



CHECKLISTA – FINGOLIMOD: PROVTAGNING OCH KONTROLLER:

OBS! "CHECKLISTA – GENERELL UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV MS-BEHANDLINGAR" gås igenom innan preparatspecifika kontroller

Preparatspecifika kontroller och åtgärder vid behandling med FINGOLIMOD

<u>KONTROLLER</u>	<u>FREKVENS</u>	<u>REG i SMSreg</u>
Särskilda kontroller inför behandling	EKG, Ögonbottenundersökning (oftalmolog) om riskfaktorer för makulaödem (ffa diabetes), Blodtryck, Hudinspektion (dermatolog), grav test för fertila kvinnor. Blodstatus med diff. VZV-serologi	Lymfocyter
Allmänt lab och immunsystemskontroller	Blodstatus med diff och leverstatus efter 3 månader, därefter årligen. IgG årligen.	Lymfocyter, IgG
Övriga kontroller	Första dosen skall ges under kardiell övervakning under minst 6 timmar med observans på bradyarytmi och blodtrycksfall. Oftalmologisk undersökning efter 3 månader, därefter årligen om riskfaktorer. BT och hudinspektion årligen	
Vaccination	VZV-vaccin måste ges före beh start om pat är negativ för VZV-Ak. Icke levande vaccin kan ges under behandling men ger sannolikt sämre skyddseffekt. Se separat dokument på SMSS hemsida rörande vilka vaccinationer som har störst värde för vilka behandlingar.	NEJ
BIOBANKSPROVER/ FORSKNINGSPROVER TILL IMSE	Prover ska tas innan start av behandling samt efter 12 och 24 månaders behandling	NEJ

Kontroller med MRI och andra kliniska parametrar följs upp fortlöpande enligt mallen **"Checklista – Generell utredning och uppföljning av MS-behandlingar"**