



CHECKLISTA - RITUXIMAB: PROVTAGNING OCH KONTROLLER

OBS! "CHECKLISTA – GENERELL UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV MS-BEHANDLINGAR" gås igenom innan preparatspecifika kontroller

Preparatspecifika kontroller och åtgärder vid behandling med RITUXIMAB

<u>KONTROLLER</u>	<u>FREKVENS</u>	<u>REG i SMSreg</u>
Särskilda kontroller inför behandling	HBV-screening (HBsAg, anti-HBc)	Nej
Allmänt lab och immunsystemskontroller	Blodstatus med diff, leverstatus, Krea, CRP, IgG, IgM inför varje infusion För kvinnor i fertil ålder grav test inför varje infusion	IgG, IgM, Lymfocyter, Neutrofiler
CD19+ B-celler	CD19+ B-celler inför varje infusion första året, därefter årligen samt vid misstänkt behandlingssvikt	Ja
RTX-ADA	Vid nytillkomna oförklarliga biverkningar som skulle kunna kopplas till behandlingen samt vid misstänkt behandlingssvikt	Provsvär i SMSreg
Vaccination	VZV om neg serologi före start av RTX beh; I övrigt om tid medges mot Pnkk, TBE, HAV+HBV, ev Tetanus booster. Om bråttom att starta beh kan pat starta med Natalizumab och genomföra alla vaccinationer (utom levande vaccin) under den behandlingen, byte till RTX ca 4 veckor efter sista vaccindosen givits. Nedsatt svar på vaccination förväntas om den genomförs inom 6 månader från föregående infusion	NEJ
BIOBANKSPROVER/ FORSKNINGSPROVER till IMSE	Prover tas innan start av behandling samt efter 12 och 24 månaders behandling	Nej

Kontroller med MRI och andra kliniska parametrar följs upp fortlöpande enligt mallen **"Checklista – Generell utredning och uppföljning av MS-behandlingar"**