



CHECKLISTA – SIPONIMOD: PROVTAGNING OCH KONTROLLER:

OBS! "CHECKLISTA – GENERELL UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV MS-BEHANDLINGAR" gås igenom innan preparatspecifika kontroller

Preparatspecifika kontroller och åtgärder vid behandling med SIPONIMOD

<u>KONTROLLER</u>	<u>FREKVENS</u>	<u>REG i SMSreg</u>
Särskilda kontroller inför behandling	EKG, CYP2C9-genotyp, Ögonbottenundersökning (oftalmolog) om riskfaktorer för makulaödem (ffa diabetes), Blodtryck, Hudinspektion (dermatolog), grav test för kvinnor i fertil ålder. Blodstatus med diff. VZV-serologi	CYP genotyp Lymfocyter
Allmänt lab och immunsystemskontroller	Blodstatus med diff och leverstatus mån 3, 6, 12, därefter årligen. IgG årligen	Lymfocyter, IgG
Övriga kontroller	Ingen kardiell övervakning vid första dos. Endast vid känd bradyarytmi eller känd hjärtsjukdom ges första dosen under kardiell övervakning under minst 6 timmar med observans på bradyarytmi och blodtrycksfall. Oftalmologisk undersökning efter 3 månader, därefter årligen om riskfaktorer. BT och hudinspektion årligen	
Vaccination	VZV-vaccin måste ges före beh start om pat är negativ för VZV-Ak. Icke levande vaccin kan ges under behandling men ger sannolikt sämre skyddseffekt. Se separat dokument på SMSS hemsida rörande vilka vaccinationer som har störst värde för vilka behandlingar.	NEJ
BIOBANKSPROVER/ FORSKNINGSPROVER TILL IMSE	Prover ska tas innan start av behandling samt efter 12 och 24 månaders behandling	NEJ

Kontroller med MRI och andra kliniska parametrar följs upp fortlöpande enligt mallen **"Checklista – Generell utredning och uppföljning av MS-behandlingar"**