

CHECKLISTA – TERIFLUNOMID: PROVTAGNING OCH KONTROLLER:

OBS! "CHECKLISTA – GENERELL UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV MS-BEHANDLINGAR" gås igenom innan preparatspecifika kontroller		
Preparatspecifika kontroller och åtgärder vid behandling med TERIFLUNOMIDE		
<u>KONTROLLER</u>	<u>FREKVENS</u>	<u>REG i SMSreg</u>
Allmänt lab och immunsystemskontroller	Levertransaminaser en gång per månad i 6 månader, därefter var 3:e månad upp till 1 år, därefter var 6:e månad. Blodstatus med diff utifrån klinisk bedömning men minst en gång årligen. Grav test för kvinnor i fertil ålder inför behandlingsstart	Lymfocyter
Vaccination	Överväg VZV-vaccin före beh start om pat är negativ för VZV-Ak. Övrig vaccination kan sannolikt ske med adekvat svar under beh med Teriflunomide men inga levande vaccin får ges. Se separat dokument på SMSS hemsida rörande vilka vaccinationer som har störst värde för vilka behandlingar.	NEJ
BIOBANKSPROVER/ FORSKNINGSPROVER TILL IMSE	Prover ska tas innan start av behandling samt efter 12 och 24 månaders behandling	NEJ
Kontroller med MRI och andra kliniska parametrar följs upp fortlöpande enligt mallen "Checklista – Generell utredning och uppföljning av MS-behandlingar"		