

CHECKLISTA – KLADRIBIN: PROVTAGNING OCH KONTROLLER:

OBS! "CHECKLISTA – GENERELL UTREDNING OCH UPPFÖLJNING AV MS-BEHANDLINGAR" gås igenom innan preparatspecifika kontroller		
Preparatspecifika kontroller och åtgärder vid behandling med KLADRIBIN		
<u>KONTROLLER</u>	<u>FREKVENS</u>	<u>REG i SMSreg</u>
Särskilda kontroller inför behandling	Blodstatus med diff, leverstatus, VZV-serologi	Lymfocyter
Allmänt lab och immunsystemskontroller	Blodstatus med diff 2 och 6 månader efter start av varje behandlingsår. Lymfocyter skall vara $\geq 0,8$ inför påbörjande av behandlingsår 2. Blodstatus med diff, leverstatus och IgG årligen efter behandlingsstart med kladrinin. Gravtest inför varje kur om fertil kvinna	Lymfocyter, IgG
Vaccination	VZV-vaccin måste ges före beh start om pat är negativ för VZV-Ak. Icke levande vaccin kan ges under behandling men uppgifter om skyddseffekt saknas ännu. Nedsatt svar på vaccination föreligger sannolikt om den genomförs inom 3 – 6 månader från senaste tablett kur. Se separat dokument på SMSS hemsida rörande vilka vaccinationer som har störst värde för vilka behandlingar.	JA
BIOBANKSPROVER/ FORSKNINGSPROVER TILL IMSE	Prover ska tas innan start av behandling samt efter 12 och 24 månaders behandling	NEJ
Kontroller med MRI och andra kliniska parametrar följs upp fortlöpande enligt mallen "Checklista – Generell utredning och uppföljning av MS-behandlingar"		