Svenska MS-sällskapet

2026-02-22

Algoritm för ställande av MS-diagnos

Kliniskt syndrom karaktäristiskt för ett **MS-skov**

Objektiv **progressiv sjukdom** i över 12 månader förenligt med MS

Initial utredning stödjer multipel skleros
- Sjukhistoria och klinisk undersökning
- Bilddiagnostik och laboratorietester
- Differentialdiagnostisk utredning

Bättre förklaringar uteslutna

Bevis för DIS FÖRELIGGER:
- *Skovvis MS*: Lesioner närvarande i 2 eller flera CNS-regioner
- *Primärprogressiv MS*: Minst 2 spinala lesioner

MS kan diagnosticeras om *minst ett* av nedanstående fynd (a-d) kan påvisas.
Stöd för spridning i tid
a) DIT kliniskt eller radiologiskt
b) Liquor immunopati
MR-fynd med hög MS-specificitet
c) CVS positivitet
d) Lesioner i 4 av 5 MS-typiska lokaler

Bevis för DIS föreligger INTE:
Skovvis MS: Lesioner närvarande i endast 1 CNS-region
Primärprogressiv MS: Endast 1 spinal lesion

MS kan diagnosticeras om *bägge* nedanstående fynd (a + b) kan påvisas.
Stöd för spridning i tid
a) Liquor immunopati *eller* DIT kliniskt eller radiologiskt
MR-fynd med hög MS-specificitet
b) CVS postivitet *eller* PRL

Algoritm för radiologiskt isolerat syndrom